List of data, formulae and relationships

Acceleration of free fall	$g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$	(close to Earth's surface)
Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$	
Coulomb's law constant	$k = 1/4\pi\varepsilon_0$	
	$= 8.99 \times 10^{9} \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$	
Electron charge	$e = -1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$	
Electron mass	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$	
Electron volt	$1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$	
Gravitational constant	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	
Gravitational field strength	$g = 9.81 \text{ N kg}^{-1}$	(close to Earth's surface)
Permittivity of free space	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$	
Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$	
Proton mass	$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$	
Speed of light in a vacuum	$c = 3.00 \times 10^{8} \text{ m s}^{-1}$	
Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$	
Unified atomic mass unit	$u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$	

Unit 1

Mechanics

Kinematic equations of motion

$$s = \frac{(u + v)t}{2}$$

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

Forces

$$\Sigma F = ma$$

$$g = \frac{F}{m}$$

$$W = mg$$

Momentum

$$p = mv$$

Moment of force

$$\text{moment} = Fx$$

Work and energy

$$\Delta W = F\Delta s$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Delta E_{grav} = mg\Delta h$$

Power

$$P = \frac{E}{t}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

Efficiency

$$\text{efficiency} = \frac{\text{useful energy output}}{\text{total energy input}}$$

$$\text{efficiency} = \frac{\text{useful power output}}{\text{total power input}}$$

Materials

Density $\rho = \frac{m}{V}$

Stokes' law $F = 6\pi\eta r v$

Hooke's law $\Delta F = k\Delta x$

Elastic strain energy $\Delta E_{\text{el}} = \frac{1}{2} F \Delta x$

Young modulus $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$ where

Stress $\sigma = \frac{F}{A}$

Strain $\varepsilon = \frac{\Delta x}{x}$

Unit 2

Waves

Wave speed	$v = f\lambda$
Speed of a transverse wave on a string	$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$
Intensity of radiation	$I = \frac{P}{A}$
Refractive index	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$
	$n = \frac{c}{v}$
Critical angle	$\sin C = \frac{1}{n}$
Diffraction grating	$n\lambda = d \sin\theta$

Electricity

Potential difference	$V = \frac{W}{Q}$
Resistance	$R = \frac{V}{I}$
Electrical power, energy	$P = VI$
	$P = I^2R$
	$P = \frac{V^2}{R}$
	$W = VIt$
Resistivity	$R = \frac{\rho l}{A}$
Current	$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
	$I = nqvA$
Resistors in series	$R = R_1 + R_2 + R_3$
Resistors in parallel	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

Particle nature of light

Photon model	$E = hf$
Einstein's photoelectric equation	$hf = \phi + \frac{1}{2}mv^2_{max}$
de Broglie wavelength	$\lambda = \frac{h}{p}$

Unit 4

Further mechanics

Impulse	$F\Delta t = \Delta p$
Kinetic energy of a non-relativistic particle	$E_k = \frac{p^2}{2m}$
Motion in a circle	$v = \omega r$
	$T = \frac{2\pi}{\omega}$
	$a = \frac{v^2}{r}$
	$a = r\omega^2$
Centripetal force	$F = ma = \frac{mv^2}{r}$
	$F = mr\omega^2$

Electric and magnetic fields

Electric field	$E = \frac{F}{Q}$
Coulomb's law	$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
	$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
	$E = \frac{V}{d}$
Electrical potential	$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
Capacitance	$C = \frac{Q}{V}$
Energy stored in capacitor	$W = \frac{1}{2}QV$
	$W = \frac{1}{2}CV^2$
	$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$
Capacitor discharge	$Q = Q_0 e^{-t/RC}$

Resistor-capacitor discharge

$$I = I_0 e^{-t/RC}$$

$$V = V_0 e^{-t/RC}$$

$$\ln Q = \ln Q_0 - \frac{t}{RC}$$

$$\ln I = \ln I_0 - \frac{t}{RC}$$

$$\ln V = \ln V_0 - \frac{t}{RC}$$

In a magnetic field

$$F = Bqv \sin \theta$$

$$F = BIl \sin \theta$$

Faraday's and Lenz's laws

$$\mathscr{E} = \frac{-\mathrm{d}(N\phi)}{\mathrm{d}t}$$

Nuclear and particle physics

In a magnetic field

$$r = \frac{p}{BQ}$$

Mass-energy

$$\Delta E = c^2 \Delta m$$